


Version à partir du triangle de contact



Hypothèses :

- ABC un triangle acutangle,
- Γ le cercle de centre I, circonscrit à ABC,
- H le point de Γ diamétralement opposé à A,
- U, V les points d'intersection de (AB) et (CH), de (AC) et (BH),
- et P un point de [UV].

Thèse : P est le milieu de [UV] si, et seulement si, les droites (PB) et (PC) sont tangentes à Γ

Scolie :


H est l'orthocentre du triangle AUV; la hauteur (AH) étant perpendiculaire à (UV) et à la tangente T_a de Γ en A en tant que diamètre de Γ , T_a est parallèle à (UV).

Démonstration :

C.N. : d'après le théorème de Möbius⁴, le cercle de diamètre [UV] passant par B et C, est orthogonal à Γ ce qui revient à dire que les droites (PB) et (PC) sont tangentes à Γ .

C.S. : d'après le théorème de Pascal, (UPV) est la pascale⁵ de l'hexagone dégénéré ABTbHCTcA; les triangles BUV et CUV étant rectangles en B et C sont inscrits dans le demi cercle de diamètre [UV] ; puis, en appliquant le théorème de Boutin, on conclut.

Version à partir du triangle tangentiel



Hypothèses :

- PQR un triangle,

⁴ Möbius A. F., mathématicien allemand (1790 -1868); le théorème : une sécante mobile étant menée par l'un des points d'intersection de deux cercles, les droites qui joignent l'autre point d'intersection aux deux extrémités de la sécante déterminent entre elles un angle constant égal à l'angle déterminé par les droites qui joignent ce même point d'intersection aux deux centres.

⁵ Cf. appendice 3.

Γ le cercle inscrit dans PQR,
 ABC le triangle de contact de PQR,
 et Δ_p une droite passant par P telle que
 U, V soient les points d'intersection de Δ_p avec (AB) et (AC).

Thèse : Δ_p est parallèle à (QR) si, et seulement si, P est le milieu de [UV]


Démonstration :

le cercle Γ_p de centre P passant par B et C coupe (AB) en U' et (AC) en V' ; d'après le théorème de Boutin, (U'V') est la parallèle à (QR) passant par le milieu P de [U'V'].

C.N. : d'après le postulat d'Euclide, $\Delta_p = (U'V')$; en conséquence, P est le milieu de [UV].

C.S. : raisonnons par l'absurde en supposant que Δ_p n'est pas parallèle à (QR); le quadrilatère UU'VV' ayant ses diagonales se coupant en leur milieu, est un parallélogramme; en conséquence, (AUU') serait parallèle à (AV'V) ce qui est contradictoire.

Une généralisation de Yaglom⁶



Hypothèses :

$\Gamma_p, \Gamma_q, \Gamma_r$ trois cercles de centre P, Q, R, deux à deux tangents extérieurement,
 A, B, C les points de contact de Γ_r et Γ_q , de Γ_q et Γ_p , de Γ_p et Γ_r ,
 U un point de Γ_p ,
 et X, Y, V les seconds points d'intersection de (UB) avec Γ_q , (XA) avec Γ_r , (YC) avec Γ_p .

Thèse : la droite (UV) passe par P.

Scolie :

U est distinct de V, sinon les cercles Γ_p, Γ_q et Γ_r seraient concourants d'après le théorème du pivot⁷ en considérant le triangle UXY avec A sur (XY), B sur (UX) et C sur (UY).

Démonstration :

notons T_u, T_x, T_y et T_v , les tangentes à $\Gamma_p, \Gamma_q, \Gamma_r$ et Γ_p en U, X, Y et V ;
 les cercles Γ_p et Γ_q, Γ_q et Γ_r, Γ_r et Γ_p conduisent au théorème de Reim ; il s'en suit que $T_u // T_x, T_x // T_y, T_y // T_v$ et par transitivité, $T_u // T_v$; puis, comme dans le deuxième point de la démonstration du théorème de Boutin, on conclut.

Scolies :

1. le résultat reste vrai lorsque deux points coïncident en considérant la tangente en ce point.
2. Nous retrouvons le théorème de Boutin lorsque X et Y coïncident avec A.
3. PQR est le triangle tangentiel de ABC.
4. Une droite parallèle à (UV) :

notons U', V' les seconds points d'intersection de (AB) et (AC) avec Γ_p ; le quadrilatère UU'VV' ayant ses diagonales se coupant en leur milieu P est un parallélogramme; en conséquence, (UU') // (VV').

⁶ Yaglom I. M., Transformations géométriques II, MAA, p. 31. Isaac Moisevitich Yaglom est né en Ukraine en 1921.

⁷ Cf. appendice 2.

Notons D le second point d'intersection de (CU) avec le cercle Γ circonscrit à ABC; les cercles Γ et Γ_p conduisent au théorème de Reim :
 (AD) // (UU'); d'où par transitivité, (AD) // (VV'). Les cercles sécants Γ et Γ_p , la droite (ACV') et les parallèles (AD) et (VV'), conduisent à l'alignement des points D, B et V; en conséquence, d'après le théorème de Reim appliqué à ces mêmes cercles, la tangente à Γ en D est parallèle à (UV).


5. Position de D :

les cercles Γ_p et Γ_q conduisent au théorème de Reim : (U'U) // (AX) et par transitivité (AD) // (AX); d'après le postulat d'Euclide, D est sur la droite (XY).

6. D étant le point d'intersection des droites (UC) et (VB), les céviennes⁸ (UB) et (VC) sont deux hauteurs du triangle DVU dont l'orthocentre H est sur Γ .

APPENDICE

Appendice 1 : le théorème de Reim⁹



Hypothèses : Γ, Γ' deux cercles sécants,
 A, B les deux points d'intersection de Γ et Γ' ,
 Da une droite passant par A,
 Q un point de Γ ,
 Q' un point de Γ'
 et Db la droite brisée (QBQ').

Thèse : Db est une droite *si, et seulement si,* (PQ) est parallèle à (P'Q').¹⁰

Scolie : ce théorème reste vrai lorsque les cercles sont tangents ou que les points P et Q sont confondus ; dans ce dernier cas, on envisage la tangente.

Appendice 2 : le théorème du pivot¹¹


⁸ Nom donné aux droites passant par un sommet d'un triangle en l'honneur de Jean de Céva (1648-1734).

⁹ Proposé aux Maxi olympiades belges de 1982.

Reim Anton (1832-1922), mathématicien allemand.

¹⁰ Une démonstration de cette équivalence peut se faire par la méthode des angles.


¹¹ Nom donné par Forder H. G. dans *Higher Course Geometry*, Cambridge Press (1949) et découvert par Miquel A., *Théorèmes de Géométrie, Journal de mathématiques pures et appliquées* de Liouville 3 (1838) 485-487.



Hypothèses : ABC un triangle,
 I un point de la droite (BC),
 J un point de la droite (CA)
 et K un point de la droite (AB).

Thèse : les cercles circonscrits aux triangles AKJ, BIK et CJI sont concourants.¹²

Appendice 3 : le théorème de Pascal¹³



Hypothèses : Γ un cercle,
 ABCDEF un hexagone inscrit dans Γ
 et P, Q, R les points d'intersection de (AB) et (DE), (BC) et (EF), (CD) et (FA).

Thèse : les points P, Q et R sont alignés.

Scolies :

1. la droite (PQR) est la pascale de l'hexagone ABCDEF.
2. Le résultat reste vrai lorsque les points C et D, E et F sont confondus; dans ce dernier cas, on remplace les côtés [CD] et [EF] par les tangentes à Γ en C et E. Cette situation particulière a été étudiée par MacLaurin ou Mac-Laurin Colin, *Traité des Fluxions* (1748) Appendice § 36.

¹² Une démonstration de ce théorème peut se faire par la méthode des angles ou à partir du théorème de Reim.

¹³ Appelé aussi "Hexagramma mysticum".
 Pascal Blaise (1623-1662).